

**Patient Exam Instructions:**

- CT Abdomen and/or Pelvis:** Pick up Barium drink from us. You will need to drink it 2 hours before your exam. Arrive ½ hour before exam for a second drink. Nothing else to eat or drink except necessary medications 4 hours prior to exam. **(G) (C)**
- CTA, CT w/contrast:** Nothing to eat or drink for 4 hours prior. **(G) (C)**
- CTA Coronary Arteries:** Same as CT with contrast. No erectile dysfunction drugs for 48 hours prior. No caffeine, decongestants, or antihistamines for 24 hours prior. Arrive at least 1 hour 15 minutes before exam time. **(G) (C)**
- CT Biopsy or Angiogram:** Patient must have driver, nothing to eat or drink except necessary meds after midnight (or 8 hours prior). Arrive 1 hour prior to exam. Bring prior x-rays, CT, angiogram. **(G) (C) (L) (B)**
- CT Enterography:** Clear liquids on the day prior to exam. Nothing to eat or drink except necessary meds the day of exam. Arrive here 1 hour prior to exam for drink. **(G) (C)**
- CT Pancreas:** No Barium drink. Nothing to eat or drink for 4 hours prior. **(G) (C)**
- CT Urogram:** Drink 32 oz. water one to two hours before exam. Nothing to eat for 4 hours prior. **(G) (C)**
- IVP (Intravenous Pyelogram):** Bowel prep needed. Get a 12 oz. bottle of magnesium citrate from a pharmacy and drink it the evening before your test. Nothing to eat or drink until the test except necessary medication like high blood pressure medicine. **(G) (C)**
- Mammography:** No deodorant, perfume, powder, or lotions on breasts or underarms. These may interfere with the test. Bring prior mammograms.
- Breast biopsy, Thyroid biopsy:** If breast, same as mammogram above. The patient must have a driver. **(B)**
- MRI & MRA:** No pacemakers, aneurysm clips (newer ones may be OK), nerve stimulators, eye injuries from metal. **(M)**
- Myelogram/Lumbar Puncture:** Driver needed. **(L) (B)**
- Paracentesis/Thoracentesis (L) (B)**
- Arthrogram, Joint Injection (B)**
- Barium Enema:** Colon cleansing prep needed. Pick up from us and follow included directions.
- Ultrasound Abdomen, Liver, Gallbladder, Pancreas:** Nothing to eat or drink for 8 hours prior to exam.
- Ultrasound - Retroperitoneal/Kidneys:** Drink 24 oz. water one hour prior to exam.
- Ultrasound - Pelvis, OB:** A full bladder is needed. Drink 48 oz. of water within thirty minutes, 1 ½ hours prior to exam. Keep bladder full, do not empty bladder until instructed by technologist.
- Upper GI, Esophagram, Small Bowel:** Nothing to eat or drink after midnight before test. No gum or nicotine day of exam.

**Paciente Examen Instrucciones:**

- Tomografía Computarizada del abdomen y/o Pelvis:** recoger la bebida que tenemos nosotros. Necesita beber 2 horas antes de su examen. Llegar 1/2 antes para tomar su segunda ración. No beba ni coma excepto medicamentos necesarios 4 horas antes de su examen. **(G)(C)**
- Tomografía Computarizada Angiografía, Tomografía Computarizada con contraste:** No comer o beber 4 horas antes. **(G) (C)**
- Tomografía Computarizada Angiografía, Arterias Coronarias:** Igual que la TC con contraste. No la disfunción eréctil las drogas durante 48 horas antes. No cafeína, los descongestionantes, antihistamínicos durante 24 horas antes. Llegue por lo menos 1 hora y 15 minutos antes del examen del tiempo. **(G) (C)**
- Tomografía Computarizada Biopsia o Angiograma:** El paciente debe tener conductor, no comer ni beber, excepto medicinas necesarias después de la medianoche (8 horas antes). Llegue 1 hora antes de examen. Traer los anteriores antes de rayos X, CT, angiograma. **(G) (C) (L) (B)**
- Tomografía Computarizada Enterography:** Líquidos claros el día antes de examen. No comer o tomar medicamentos necesarios, excepto el día del examen. Llegar aquí 1 hora antes de examen para beber. **(G) (C)**
- Tomografía Computarizada Páncreas:** No es necesario beber Bario. No comer o beber durante 4 horas antes. **(G) (C)**
- Tomografía Computarizada Urogram:** Tomar 32 oz. de agua una o dos horas antes del examen. No comer durante 4 horas antes. **(G) (C)**
- IVP (Pyelogram Intravenoso):** intestinales prep. Obtenga una botella de 12 oz. citrato de magnesio de una farmacia y beba la noche antes de su prueba. No comer ni beber hasta la prueba, excepto los medicamentos necesarios, como la para presión alta. **(G) (C)**
- Mamografía:** No desodorante, perfume, polvo, o lociones en los senos o axilas. Estos pueden interferir con la prueba. Traiga anteriores mamografías.
- Biopsia de mama, biopsia de tiroides:** Si senos, mismo indicaciones que la mamografía. El paciente debe tener un conductor. **(B)**
- Imágenes de Resonancia Magnética/ La Angiografía por Resonancia Magnética:** No marcapasos, clips de aneurisma (las más nuevas pueden estar bien), estimuladores del nervio, lesiones en los ojos con metal. **(M)**
- Mielograma / Punción Lumbar: Conductor necesario. (L) (B)**
- Paracentesis / Thoracentesis (L) (B)**
- Arthrogram, Conjunto de Inyección (B)**
- Enema de Bario:** Colón limpieza prep. Recoyer con nosotros y siga las direcciones incluidas.
- Ultrasonido abdomen, hígado, la vesícula biliar, páncreas:** No hay nada que comer nada durante 8 horas antes de su examen.
- Ultrasonido - Riñones:** Beba 24 oz. agua una hora antes del examen.
- Ultrasonido - Pelvis, Obstétrico:** En necesario que la vejiga este llena. Beba 48 oz. de agua dentro de treinta minutos, 1 a 1 ½ horas antes de su examen. Mantenga la vejiga llena, no vacíe la vejiga hasta que le indique el tecnólogo.
- Alta GI, Esophagram, Intestino Delgado:** No comer o beber después de la medianoche antes de la prueba. No chicle de nicotina en la mañana del examen.

- (G) GLUCOPHAGE Precaution:** If you take this or metformin in any form and are scheduled for an exam with IV contrast (not MRI), discontinue the medication the day of the exam and do not restart until approved by your physician. **GLUCOPHAGE Precaución:** Si usted toma este metformina o en cualquiera de sus formas y está previsto que un examen con contraste IV (no MRI), suspender el medicamento el día del examen y no continuar ser aprobado por.
- (C) CONTRAST (IODINE) Precaution:** If you had a prior significant allergic reaction, you need to discuss this with your physician or notify us 2 days before the exam. You will need a blood test (BUN and Creatinine within 90 days) if you are DIABETIC, have known kidney failure (poor kidney function), over 75 years old. **CONTRASTE Precaución:** Si antes tenía un importante reacción alérgica, es necesario que usted hable con su médico o notificarnos 2 días antes del examen. Usted necesitará una prueba de sangre (BUN y creatinina dentro de los 90 días) si usted es diabético, han conocido el fallo renal (mala función renal), más de 75 años de edad.
- (L) LABS:** Blood test required for angiograms, stereotactic and core breast biopsy, CT biopsy, myelograms, lumbar puncture, thoracentesis, paracentesis. INR, PTT, platelet count should be drawn at least 3 days prior. **LABS:** análisis de sangre necesarios para angiografía, estereotáctica y el núcleo principal de biopsia de mama, biopsia CT, mielogramas, punción lumbar, thoracentesis, paracentesis. INR, PTT, plaquetas deben proceder de al menos 3 días antes.
- (B) BLOOD THINNERS:** Discontinue blood thinners such as Plavix, Coumadin, Aspirin, NSAIDS for 5 days prior to procedure. Do not stop Plavix without permission from the prescribing physician. **ANTICOAGULANTES:** Suspender el tratamiento de anticoagulantes, como Plavix, Cumadín, aspirina, AINES durante 5 días antes de la biopsia. No deje de, tomar Plavix sin permiso del médico que prescribe. Use cómoda, ropa suelta.
- (M) MRI CONTRAST Precaution:** A blood test is required (Serum/Creatinine) within 6 weeks if you are diabetic, have hypertension, liver or renal disease, 60 years of age or over, or on dialysis. If on dialysis, dialysis must be completed within 24 hours of having gadolinium injections. **MR de CONTRASTE Precaución:** Una prueba de sangre se requiere (Creatinina sérica) dentro de 6 semanas si usted es diabético, padece de hipertensión, enfermedades del hígado o renal, 60 años de edad o mas, o en diálisis. Si en diálisis debe ser completado dentro de 24 horas de tener inyecciones de gadolinio.